



Рекомендации по применению

Перед применением внимательно прочитать!

Назначение: фунгицид для защиты озимых и яровых зерновых культур, сахарной свеклы.
Регистрант: ООО «Агрозащита плюс», Беларусь, Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Фрунзе, д.9, Тел./факс +375 (17) 294 36 36.
Ningbo Lido International Incorporation Co., Ltd, China. Room 2806, Bank of China Mansion, N 139 Yaohang street, Ningbo, China.

Производство и упаковка: Ningbo Lido International Incorporation Co., Ltd, China. Room 2806, Bank of China Mansion, N 139 Yaohang street, Ningbo, China.

Порядок приготовления рабочей жидкости.

Перед началом работы проверить чистоту бака, шлангов и распылителей, а также готовность всего опрыскивающего оборудования. Рабочий раствор следует готовить непосредственно перед применением. Во вспомогательную емкость (ведро, бак) налить 10-20 л воды, добавить необходимое количество препарата и вручную перемешать в течение 0,5-1 мин.

Полученную смесь вылить в бак опрыскивателя, на 3/4 заполненный водой. Освободившуюся вспомогательную емкость трижды прополоскать водой, которую также слить в бак опрыскивателя. Долить воду до полного объема и тщательно перемешать. Приготовление рабочего раствора и заправку опрыскивателя проводят на специальных площадках, которые в дальнейшем подвергаются обезвреживанию. Опрыскивание проводить в безветренную погоду, исправной опрыскивающей аппаратурой.

Период защитного действия.

Период защитного действия составляет от 3 до 4 недель.

Скорость воздействия.

Начальное действие через 3-7 дней.

Совместимость с другими пестицидами.

Совместим с большинством фунгицидов. Известна совместимость с такими фунгицидами как фенпропиморф, карбендазим, хлорталонил, тиабендазол, тридеморф и др. Перед применением в смеси с другими фунгицидами или инсектицидами рекомендуется проверить на совместимость.

Возможность варьирования культур в севообороте.

Препарат не фитотоксичен для сельскохозяйственных культур в рекомендуемых нормах расхода. Его остаточные количества не обнаруживаются, поэтому он не может влиять на варьирование культур в севообороте.

Фитотоксичность.

Не применять препарат, когда культура находится в состоянии стресса из-за нападения вредителей, заморозков, сильных дождей.

Токсичность.

Гриптоль Экстра, КЭ относится к III классу опасности.

Возможность возникновения резистентности.

Не выявлена. Для предотвращения возникновения резистентности необходимо чередование обработок фунгицидами из других химических групп.

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны.

Препарат малотоксичен для млекопитающих и рыб, практически не токсичен для птиц, почвенных организмов, дождевых червей. Запрещается заправка и промывка опрыскивателя вне заправочной площадки, а также попадание препарата в водоемы...

ГРИТОЛЬ ЭКСТРА, КЭ

Действующее вещество: пропиконазол + прохлораз
Концентрация: 90 г/л + 400 г/л
Препаративная форма: концентрат эмульсии

Гриптоль Экстра, КЭ малоопасный для пчел пестицид (П-3). Необходимо соблюдать следующие экологические регламенты.

Опрыскивание проводить в безветренную погоду, (не более 4-5 м/сек), при температуре воздуха не выше 25° С.

Предварительно оповещать (3-5 дней) местных общественных и индивидуальных пчеловодов о сроках и зоне запланированных обработок (погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км). Ограничение лета пчел - 24 - 48 часа.

Меры безопасности при работе, транспортировке и хранении.

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 2.2.3. 12-17-2003 «Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов», Минск, 2004 г.

Работавшие с пестицидом должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты: спецодежда (комбинезон, нарукавники и фартук), обувь (резиновые сапоги), резиновые перчатки. После работы с препаратом необходимо принять душ, сменить спецодежду и белье. На рабочем месте запрещается принимать пищу, пить, курить. Хранение препарата допускается в складах, предназначенных для хранения пестицидов, в герметично закрытой заводской упаковке, снабженной этикеткой, с указанием наименования препарата и даты его изготовления.

Не допускается хранение препарата совместно с пищевыми продуктами, а так же рядом с горючими материалами.

Способы обезвреживания пролитого или рассыпанного пестицида, способы обезвреживания, утилизации тары и остатков пестицида.

Пролитый препарат должен быть засыпан большим количеством песка до полного его впитывания. Участок земли необходимо обработать 10 % - ным раствором щелочи, а затем перекопать. Остатки пестицида должны быть собраны в отдельную емкость, промывные воды-слиты в ту же емкость. Нейтрализация промывных вод и остатков препарата необходимо осуществлять 10 %-ным раствором щелочи. Сточные воды и отходы после нейтрализации собирают в накопительную емкость, откуда их сливают в специальную яму глубиной не менее 1 метра. Расположение ямы должно быть согласовано с местными службами Санэпиднадзора.

Не допускается вторичное использование тары для хозяйственных нужд.

Меры первой помощи при отравлении.

При первых признаках отравления (тошнота, рвота, общее недомогание, слабость) немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух. При попадании на кожу: удалить препарат куском материи, смыть струей воды или слабым содовым раствором.

При попадании препарата в глаза: промывать глаза в течение 15 минут под струей воды, стараясь держать глаза открытыми. Если раздражение осталось, немедленно обратиться к врачу.

В любом случае обратиться к врачу с тарной этикеткой или инструкцией по применению. Специфических антидотов нет, лечение симптоматическое.

Срок годности: 2 года со дня изготовления, при хранении в оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте при температуре от - 35°С до + 50°С

Перед применением препарат следует перемешать.

Номер государственной регистрации пестицида: 02 - 0135

Регистрационный номер тарной этикетки: ТРБ - 02 - 0138

Культура	Вредный организм	Норма расхода, л/га	Способ, время обработки, ограничения	Сроки ожидания (кратность обработки)
Рож озимая, пшеница, тритикале и ячмень озимые и яровые	Мучнистая роса, ржавчина, ринхоспориоз, септориоз листьев, сетчатая пятнистость	0,8-1	Опрыскивание в период вегетации	56-63(1)
Рож озимая, пшеница, тритикале и ячмень озимые и яровые	Фузариоз и септориоз колоса	1	Опрыскивание в период вегетации	56-63(1)
Свекла сахарная	Мучнистая роса, перкоспориоз	0,8-1	Опрыскивание в период вегетации	40(1)
Ранс яровой	Альтернариоз	0,8-1	Опрыскивание в фазу цветения	46(1)