

САНКОР, ВДГ

Действующие вещества: римсульфурон + никоссульфурон + мезотрион

Концентрация: 4,3% + 12% + 40%

Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

Назначение: гербицид для уничтожения однолетних двудольных и однолетних и многолетних злаковых сорняков в посевах кукурузы.

Регистрант:	ООО «Агрозащита плюс», Беларусь Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Фрунзе, д. 9 Тел./факс: +375(17) 294 36 36 Ningbo Lido International Incorporation Co., Ltd, China, Room 2806, Bank of China Mansion, N 139 Yaohang street, Ningbo, China.
Производство и упаковка:	Ningbo Lido International Incorporation Co., Ltd, China, Room 2806, Bank of China Mansion, N 139 Yaohang street, Ningbo, China.

Хранение: хранить в оригинальной заводской упаковке при температуре от -10 °С до +35 °С.

Ограничения: не воспламеняется. Не коррозионный. Не следует применять препарат повторно. В случае пересева высевать кукурузу. После глубокой вспашки осенью высевать озимые зерновые культуры и озимый рапс. Не высевать на следующий год свеклу (сахарную, кормовую, столовую), горох и бобы.

Период защитного действия: полная гибель сорняков наступает через 1-3 недели. Признаки угнетения сорной растительности в виде хлороза в точке роста наблюдаются через 5-10 суток.

Токсичность: 3 класс опасности (умеренно токсичное соединение).

Срок годности: 2 года.

Дата изготовления: смотри на упаковке.

Номер партии: смотри на упаковке.

Номер регистрации: 04-0556

Регистрационный номер тарной этикетки: ТРБ-04-0453

Масса нетто: 600 г



САНКОР, ВДГ Рекомендации по применению.

Наименование: Санкор, ВДГ.

Действующие вещества: римсульфурон + никоссульфурон + мезотрион.

Концентрация: 4,3 % + 12% + 40%.

Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы (ВДГ).

Регистрант ООО «Агрозащита плюс», Беларусь
Республика Беларусь 220034, г. Минск, ул. Фрунзе, д. 9
Тел./факс: +375(17) 294 36 36
Ningbo Lido International Incorporation Co., Ltd, China, Room 2806, Bank of China Mansion, N 139 Yaohang street, Ningbo, China.
Производство и упаковка: Ningbo Lido International Incorporation Co., Ltd, China, Room 2806, Bank of China Mansion, N 139 Yaohang street, Ningbo, China.

Назначение: гербицид для уничтожения однолетних двудольных и однолетних и многолетних злаковых сорняков в посевах кукурузы.

Рекомендации по применению:

Культура	Норма расхода (кг/га)	Способ, время обработки, особенности применения	Вредный объект
Кукуруза (кроме семенных посевов)	0,25–0,3	Опрыскивание посева в фазу 2–6 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10–15 см	Однолетние и многолетние злаковые, однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки

Порядок приготовления рабочей жидкости.

Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением. Отвешивают необходимое количество препарата на одну заправку опрыскивателя и готовят маточный раствор. Для приготовления маточного раствора емкость (ведро) наполняют на одну четверть водой, высыпая отвешенное количество гербицида, тщательно перемешивают в течение 10–15 минут, доливают водой до полного объема и снова перемешивают. Для приготовления рабочего раствора бак опрыскивателя наполняют примерно половиной водой, вливают в него маточный раствор гербицида, доливают водой до полного объема и перемешивают механическими мешалками. Рабочий раствор гербицида и заправку опрыскивателя производят на специальных заправочных площадках.

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны -

Не применять в водоохранной рыбохозяйственной зоне.

Санкор, ВДГ малоопасен для пчел (П-3). Необходимо соблюдать соответствующие экологические регламенты:

– обработку растений проводить ранним утром или поздним вечером;

– скорость ветра до 4–5 м/с;

– погранично-защитная зона для пчел не менее 3–4 км;

– продолжительность ограничения лета пчел..... 24–48 часов.

Совместимость с другими препаратами.

Не совместим с фосфорорганическими инсектицидами, если их применение проходит за 10 дней до обработки препаратом Санкор, ВДГ. Не желательно применять на свежепроизвесткованных почвах и известковать почвы после применения препарата.

Возможность варьирования культур в севообороте.

В год применения гербицида Санкор, ВДГ после глубокой вспашки осенью высевать

озимые зерновые культуры и озимый рапс. На следующий год не высевать сахарную, столовую, кормовую свеклу, овощные культуры, горох, бобы.

Токсичность: 3 класс опасности (умеренно опасное соединение).

Меры безопасности при работе, транспортировке и хранении:

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно Санитарным норм и правил "Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений".

Лица, занятые работой с препаратом должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты: спецодежда (комбинезон с водоотталкивающей пропиткой, нарукавники и фартук из прорезиненной ткани), спецобувь (резиновые сапоги), резиновые перчатки, респиратор, защитные очки. После работы необходимо принять душ, сменить спецодежду и белье. К работе с препаратом не допускаются лица моложе 18 лет, беременные и кормящие женщины. На рабочем месте запрещается принимать пищу, пить, курить.

Хранение препарата допускается в складах, предназначенных для хранения пестицидов, в герметично закрытой заводской упаковке, снабженной этикеткой, с указанием наименования препарата и даты его изготовления. Не допускается хранение препарата совместно с пищевыми продуктами и фуражом, а также рядом с горючими материалами. Запрещается хранение препарата вблизи отопительных приборов и в поврежденной таре.

Способы обезвреживания пролитого или рассыпанного пестицида, способы обезвреживания, утилизации тары и остатков пестицида:

Пролитый препарат должен быть засыпан опилками до полного его впитывания. Собранные опилки должны быть сожжены в специальных местах, расположенных на расстоянии не менее 200 м от жилых и производственных построек.

При проливе препарата на землю необходимо участок земли обработать 10%-ным раствором щелочи, а затем перекопать. Остатки пестицида должны быть собраны в отдельную емкость. Промывные воды должны быть слиты в ту же емкость.

Нейтрализацию промывных вод и остатков препарата необходимо осуществлять 10%-ным раствором щелочи. Сточные воды и отходы после нейтрализации собирать в накопительную емкость, откуда их сливают в специальную яму глубиной не менее 1 метра, расположение которой должно быть согласовано с местными службами Санэпиднадзора.

Не допускается вторичное использование тары для хозяйственных нужд.

Меры первой помощи при отравлении.

Антидота нет. Лечение симптоматическое.

При первых признаках недомогания, пострадавшего необходимо немедленно отстранить от работы и вывести из зоны воздействия пестицида, снять одежду и средства индивидуальной защиты, избегая попадания препарата на кожу или органы дыхания.

При попадании на кожу – удалить препарат с кожи куском ткани, ваты (не втирая его), а затем обмыть загрязненный участок водой с мылом.

При попадании на одежду – после снятия загрязненной одежды, промыть участки возможного загрязнения кожи.

При попадании в глаза – держа веки открытыми немедленно промыть глаза большим количеством чистой проточной воды до полного удаления вещества. После оказания первой помощи немедленно обратиться к врачу.

Номер регистрации: 04-0556

Регистрационный номер тарной этикетки: ТРБ-04-0453